

ネコソギクイックプロシャワー

実際に使用する際は必ず商品ラベルをよく読み、記載内容に従ってお使いください。

農林水産省登録 第 23279 号

農薬の名称 ネコソギクイックプロシャワー

農薬の種類 グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤

成分

- ・ グリホサートイソプロピルアミン塩 ・ ・ 0.30%
 [イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート]
- ・ ピラフルフェンエチル ・ ・ ・ ・ ・ 0.0016%
 [エチル=2-クロロ-5-(4-クロロ-5-ジフルオロメトキシ-1-メチルピラゾール-3-イル)-4-フルオロフェノキシアセタート]
- ・ 水、界面活性剤等 ・ ・ ・ ・ ・ 99.6984%

性状 類白色水和性懸濁液体

適用雑草と使用方法

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 使用方法 | 総使用回数※ | | |
|------|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|------------|
| | | | | | | 本剤 | グリホサート | ピラフルフェンエチル |
| かんきつ | — | 一年生及び多年生雑草 | 収穫 7 日前まで (雑草生育期： 草丈 30 cm 以下) | 60mL/m ² 原液散布 | 雑草茎葉散布 | 3 回 | 5 回 | 3 回 |
| 樹木等 | 公園 庭園 堤とう 道路 運動場 宅地 鉄道のり面 等 | | スギナ | 雑草生育期 (草丈 30 cm 以下) | 100mL/m ² 原液散布 | | | |
| | | 200mL/m ² 原液散布 | | | 3 回 | | | |

※は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

■ 散布前に容器をよく振ってください。キャップをあけて、原液のまま規定量を雑草の茎葉全体にしっかりとかかるように散布します。

効果・薬害等の注意

- 容器をよく振ってから使用する。
- 散布後、効果の発現までに一年生雑草では2～4日、多年生雑草では1～2週間を要するので、この間に刈り取らない。
- 土壌が流亡したり、くずれたりするおそれのある所では使用しない。
- 激しい降雨が予想される場合は使用をさける（効果）
- スギナ防除に際しては、スギナの生育期を過ぎた時期での散布及びスギナが他雑草の中に埋没しているような条件では効果が劣ることがあるので、適期にスギナにかかるように注意して散布する。
- 農作物や有用植物にかかると強い薬害を生ずるので、風向きなどに十分注意してかからないように散布する。
- 散布液が水槽、池に入らないように散布する。
- 水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分注意する。
- 散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理する。

安全使用上の注意

- 眼に入らないように注意。眼に入った場合には直ちに水洗する（弱い刺激性）
- 散布時は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。[マスク着用マーク]
-
- 公園、堤とうなどで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等留意する。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。

保管・・・密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所。